

NOTE III.

COLÉOPTÈRES NOUVEAUX
DES INDES ORIENTALES, DE LA FAMILLE DES
SCARABAEIDAE, RHIPIDOCERIDAE, TENEBRIONIDAE
ET OEDEMERIDAE

DÉCRITS PAR

L. FAIRMAIRE.***Scarabaeidae.****Rhyparus sumatrensis*, n. sp.

Long. 7 mill. — *R. Desjardinsii* valde similis, sed multo major et prothorace medio elytris haud angustiore; capite brevi, fere truncato, fronte breviter quadriplicato, genis ampliatis; prothorace lateribus antice fortius emarginato, dorso medio carinis duabus integris parallelis, utrinque carina post medium interrupta et carina externa integra, angulis posticis valde obtusis; elytris post medium angustatis, apice truncatulis, sutura paulo elevata, utrinque costis 3, prima magis elevata, apice bituberosa, intervallis biseriatim granuloso-punctatis; pedibus sat gracilibus, tibiis prismaticis, 4 posticis intus basi leviter sinuatis.

Hab. Sumatra. — Ma collection.

Une nouvelle espèce du genre *Rhyparus* est un fait d'autant plus intéressant qu'elle provient de Sumatra, tandis que le type est de l'île Bourbon, où notre collègue, feu Coquerel, a trouvé deux exemplaires dans la plaine des Cafres. Notre nouvelle espèce diffère de ce type, outre la taille bien plus

forte, par la sculpture de la tête, par le corselet ayant au milieu deux carènes parallèles et par les élytres dont les carènes sont droites et égales.

Rhipidoceridae.

Homoeorhipis bicolor, n. sp.

Long. 12 mill. — Rufo-aurantiaca, vix nitidula, elytris nigris, nitidis, vage cœrulescentibus, capite nigro, summo, clypeo et ore exceptis, antennis pedibusque nigris, femoribus exceptis, unguibus rufo-piceis; capite dense sat subtiliter rugoso, summo medio obsolete foveolato, inter oculos transversim impresso, antennis opacis, articulo 1° nitidulo, rugosulo, medium corporis attingentibus, articulis elongatis, sat breviter flabellatis, flabellis æqualibus, articulis vix duplo longioribus; prothorace basi elytris haud angustiore, a basi antice attenuato, lateribus fere rectis, dorso antice valde convexo, sat subtiliter dense rugoso-punctato, antice medio obsoletissime sulcatulo, postice utrinque sat profunde impresso, margine postico utrinque sinuato, medio fere lobato-truncato et levissime incrassato, angulis posticis subacutis; scutello fere rotundato, depresso, aurantiaco; elytris sat elongatis, apice obtuse rotundatis, sutura et utrinque costis 4 elevatis, basi depressiusculis, intervallis punctis grossis transversis dense biseriatis, costis 2 et 3 ante apicem conjunctis; subtus dense subtiliter rugosulo-punctulata, fulvo-pubescens, tibiis rugosis, 4 primis extus subtiliter denticulatis, fusco-setosulis.

Hab. Ins. Nias (J. D. Pasteur). — Un seul exemplaire ♂ du Musée de Leide.

Diffère de l'*H. mesomelaena* par la coloration des pattes et des élytres, par ces dernières ayant de fortes côtes saillantes, par le corselet n'ayant qu'une impression de chaque côté, sans sillon médian, le bord postérieur tronqué au milieu et par les antennes à flabelles courtes.

Simianus cribripennis, n. sp.

Long. 13 mill. — Elongatus, sat convexus, rufo-casta-

nescens, vix nitidulus, fulvido-pubescent; capite rufo, sat parvo, dense subtiliter punctato-rugosulo, medio oblonge impresso, oculis valde distantibus, subglobosis, subtiliter granulatis, antennis piceis, articulo 1° rufo, gracilibus, flabellis elongatis, medium elytrorum vix superantibus; prothorace fere trapeziformi, elytris haud angustiore, antice leviter attenuato, lateribus fere rectis, ad angulos anticos tantum breviter rotundatis, dorso æquali, convexo, subtiliter dense punctato, utrinque postice obsolete biimpresso, margine postico fere recto, angulis acutiusculis; scutello fere rotundato; elytris elongatis, dense seriato-punctatis, punctis subquadratis, ocellatis, intervallis transversis plicatulis, sutura et intervallis 3, 5, 7 levissime elevatis; prosterno ad marginem anticum acute bispinoso, abdomine paulo dilutiore, densissime punctulato.

Hab. Bornéo (S. Müller). — Un seul exemplaire ♂ du Musée de Leide.

Distinct de ses congénères par sa coloration uniforme d'un marron roussâtre avec la tête rousse et par ses élytres obtusément arrondies à l'extrémité, couvertes de gros points serrés en séries, sans côtes un peu saillantes; les fémurs ne sont pas pubescents.

Tenebrionidae.

Bradymerus grandis, n. sp.

Long. 10 mill. — Oblongus, sat fortiter convexus, sed dorso planiusculus, fuscus, nitidus, fere metallescens; capite dense rugosulo-punctato, sutura clypeali parum impressa, margine antico obsolete sinuato, antennis piceo-rufis, gracilibus, apice paulo clavatis; prothorace valde transverso, elytris angustiore, antice et basi fere æquilato, lateribus rotundatis, basi tantum sinuatis, margine postico medio rotundatim lobato, utrinque sat fortiter sinuato, angulis posticis sat acutis, dorso dense ac fortiter asperato, basi sat fortiter marginato et læviore, angulis anticis sat productis; scutello minuto, triangulari; elytris ovatis, basi

truncatis, apice obtusis, cum sutura fortiter et acute carinatis, carina præscutellari brevissima, interstitiis concavis, clathrato-foveolatis, subtus parce punctulatus, abdomine strigoso-punctato, pedibus dense rugosis.

Hab. Java orient.: Bezoeki (Semmeling et Groen). — Deux exemplaires du Musée de Leide.

Ressemble assez au *B. granaticollis* Fairm., mais un peu plus grand, le corselet n'est pas crénelé sur les côtés, les angles antérieurs sont moins saillants, les carènes des élytres sont bien plus tranchantes, entières, et les interstices, bien plus larges, sont remplis par des fossettes peu profondes, séparées par des plis transversaux; la carène præscutellaire est courte mais bien marquée.

Bradymerus granulipennis, n. sp.

Long. 7 mill. — Oblongus, sat convexus, fuscus, indumento terreno vestitus; capite sat lato, brevi, genis angulatim dilatatis, sat dense granulato, clypeo utrinque foveato, antennis brevibus, articulis 3 ultimis dilatatis, brevibus; prothorace elytris vix angustiore, valde transverso, subquadrato, antice haud angustiore, lateribus vix arcuatis, dorso dense asperato-granuloso, margine postico leviter bisinuato, angulis omnibus fere rectis; scutello sat lato, obtuso; elytris ad humeros sat rotundatis, apice obtuso, striatulis, intervallis seriatim parum regulariter tuberculatis, alternatim paulo convexiusculis; subtus nitidior, asperulo-punctulatus, pedibus sat brevibus, femoribus crassiusculis.

Hab. Bornéo occ.: Sambah (Dr. J. Bosscha). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

La granulation assez fine et assez serrée des élytres fera reconnaître facilement cette espèce. L'unique individu est recouvert d'un enduit terreux qui disparaîtrait peut-être par un lavage malheureusement dangereux pour l'état de conservation de l'insecte.

Bradymerus aequicostatus, n. sp.

Long. 6 à 8 mill. — Oblongus, modice convexus, piceo-

fuscus, parum nitidus, subtus cum pedibus, antennis et ore piceo-rufescens; capite planato, dense subtiliter asperulopunctato, antice fere truncato, antennis basin prothoracis haud attingentibus, articulis 6 ultimis latoribus; prothorace valde transverso, elytris vix angustiore, antice vix angustato, lateribus parum arcuatis, integris aut obsoletissime undulatis, dorso sat subtiliter dense punctato-granulato, lateribus paulo marginato, angulis anticis productis, apice obtusis, posticis acute rectis; scutello subcordato, apice acutiusculo, punctulato; elytris ad humeros valde angulatis, apice obtusis, substriato-punctatis, intervallis costulatis, costulis æqualiter elevatis, 1^a 2^aque usque post medium planiusculis; subtus dense punctatus, pedibus mediocribus.

Hab. Bornéo: Moeara teweh (J. Semmeliuk), Sambas (J. Bosscha). — Quelques exemplaires du Musée de Leide.

Ressemble assez au *B. sublaevicollis* Fairm., des îles Viti, pour la forme générale et la sculpture des élytres, mais la sculpture du corselet est bien différente, les 6 derniers articles des antennes sont plus larges, les côtes des élytres sont plus nettes, plus saillantes, plus égales, et les stries sont plus fortement et plus également ponctuées.

Ceropria bifoveata, n. sp.

Long. 12 mill. — Ovato-elliptica, parum convexa, valde nitida, viridi-æneo-cœrulescens, prothorace maculatim purpureo micante, elytris æneo-cœrulescenti et purpureo fere tessellatis; capite sat brevi, fere indistincte punctulato, oculis antice valde approximatis, extus fere angulatim convexis, antennis fuscis, opacis, dense punctatis, valde serratis, basin prothoracis superantibus, articulo 2^o brevi, 3^o angusto, ceteris sat late triangularibus; prothorace elytrorum basi vix angustiore, longitudine duplo latiore, antice rotundatim angustato, dorso subtiliter dense punctulato, basi utrinque foveato, margine postico utrinque late sinuato, angulis posticis rectis; scutello triangulari, impressiusculo; elytris sat amplis, ovatis, striatis, striis dense

sat subtiliter punctatis, apice paulo profundioribus, intervallis vix convexiusculis; subtus fusca, vage cœrulescens, sat nitida, lævis, abdomine subtilissime striolato, tibiis anterioribus leviter arcuatis et tarsis articulis 4 primis sat dilatatis.

Hab. Bornéo (Schwaner). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Ressemble à la *C. induta*, mais plus grande, plus ample, avec les couleurs plus disposées en damier, les yeux plus saillants, le corselet ayant à la base 2 fossettes bien marquées, les stries des élytres plus finement ponctuées et les tibias antérieurs légèrement arqués.

Ceropria rufofasciata, n. sp.

Long. 10 mill. — Ovata, modice convexa, nigro-fusca, nitida, elytris utrinque fasciis 2 rufis ornatis, suturam haud attingentibus, 1^a ante medium transversa, valde dentata, 2^a fere apicali, paulo obliqua; capite subtiliter punctulato, inter oculos impresso, antice transversim sulcatulo et utrinque impresso, oculis valde transversis, antice approximatis, antennis elongatis, fuscis, opacis, apicem versus paulo latioribus, articulis 6—10 fere triangularibus, 9^o et 10^o latioribus et brevioribus; prothorace elytris haud angustiore, longitudine duplo latiore, antice angustato, lateribus sat rotundatis, dorso subtiliter sat dense punctato, basi biimpresso et medio rotundatim paulo lobato; scutello valde obtuso; elytris ovatis, basi truncatis, subtiliter substriato-punctatis, intervallis planis, subtilissime sat dense punctulatis; subtus cum pedibus fuscus, nitidus, vage ænescens, abdomine lateribus, medio obsolete striolato, prosterno apice compresso, acuto, mesosterno antice acute excavato.

Hab. Bornéo (S. Müller). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Ressemble beaucoup à la *Ceropria bifasciata* Chevr., de Bombay, mais cette dernière est bien plus oblongue, plus parallèle, avec le corselet moins court, moins impressionné

à la base, les élytres bien plus fortement striées-punctuées, à intervalles moins plans, à bande antérieure, traversant les élytres, à peine dentée, et les antennes plus courtes, à articles 4—10 transversaux.

Holamara picescens Fairm.

(Ann. Soc. Ent. Belg. 1885, C. R. p. cix).

Cet insecte, que j'ai décrit d'après des individus récoltés à Sumatra, se trouve à Java, à Bornéo et aussi en Chine, dans le Tokien. Il doit reprendre le nom de *lateralis*, sous lequel il a été décrit par Boheman, comme *Heterophaga*, dans le voyage de la frégate Eugénie.

Uloma compacta, n. sp.

Long. 9 mill. — Oblongo-ovata, modice convexa, fusco-picea, nitida; capite antice rufescente, subtilissime punctulato, vertice dense punctato, inter oculos transversim sulcato, antice transversim impresso, margine antico in-crassato; antennis rufo-piceis, brevibus, latis, articulis 5—10 transversis; prothorace transverso, sat amplo, elytris fere latiore, antice angustato, lateribus a medio arcuatis, dorso subtilissime sat dense punctato, antice haud impresso, margine postico fere recto, angulis posticis fere rectis, anticis fere rotundatis; scutello ogivali, lævi; elytris ovatis, basi truncatis, sat fortiter striatis, striis subtiliter fere obsolete punctatis, intervallis convexis, lævibus, apice magis elevatis; prosterno dense rugoso-punctato, medio lævi, carinato, metasterno lateribus tantum punctato, abdomine lateribus striolato, pedibus rufis, tibiis apice rugosis, anticis fortiter, intermediis minus et posticis vix dentatis.

Hab. Bornéo occ.: Sambas (Dr. J. Bosscha). — Deux exemplaires du Musée de Leide.

Ressemble assez à l'*U. rufilabris*, de Sumatra, mais bien plus grande, avec le corselet plus ample, rétréci seulement en avant du milieu et les intervalles des élytres un peu plus convexes; le corps est aussi plus convexe et les pattes sont presque lisses sauf l'extrémité des tibias.

Uloma haemorrhœa, n. sp.

Long. 7 mill. — Oblonga, subparallela, fusca, nitida, sat convexa, elytris apice sanguineo terminatis; capite sat dense punctulato, inter oculos transversim et antice arcuatim impresso, ore et antennis castaneo-rufis, his validis, apicem versus latioribus; prothorace transversim subquadrato, lateribus parallelis, antice tantum rotundatis, dorso dense parum subtiliter punctato; scutello brevi, obtuso; elytris apice obtuse rotundatis, parum profunde punctostriatis, intervallis convexiusculis, subtiliter sat dense punctulatis; subtus cum epipleuris et pedibus piceo-rufa, dense sat fortiter punctata, tibiis interdum obscurioribus, subtiliter denticulatis.

Hab. Bornéo: Sintang. — Quatre exemplaires du Musée de Leide, présentés par M. G. Severin.

Ressemble extrêmement à l'*U. picicornis*, n'en diffère, outre la coloration de l'extrémité des élytres, que par la tête moins impressionnée, les antennes plus longues, n'ayant que les 5 derniers articles élargis et bien moins courts, le 3^e article bien plus long que le suivant au lieu d'être égal, et les tibias plus finement denticulés. Je n'ai vu que des ♀; le corselet est peut-être impressionné en avant chez les ♂.

Uloma truncata, n. sp.

Long. 10 mill. — Oblonga, parallela, convexa, picea, nitida; capite subtilissime punctato, transversim concavo et impresso, margine antico incrassato, fronte inermi, antennis latis, compressis, articulis 5—10 brevibus, transversis, ultimo fere truncato; prothorace transversim subquadrato, antice parum attenuato, dorso subtiliter sat dense punctulato, antice late truncato, angulis anticis rotundatis; scutello obtuso, lævi; elytris apice rotundatis, sat fortiter striatis, striis parum fortiter punctatis, punctis apice obsolete, intervallis convexiusculis, subtiliter alutaceis et fere inconspicue punctulatis; subtus cum elytrorum margine angusto, pedibus et ore rufo-castanea, dense punctata,

abdomine lateribus strigosulo, tibiis omnibus extus denticulatis.

Hab. Bornéo (Diard). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Cette *Uloma* est bien reconnaissable à son corselet quadrangulaire, à peine rétréci près des angles antérieurs; et largement tronqué en avant avec le rebord de la troncature un peu tranchant; la tête est assez fortement creusée en travers, épaissie au bord antérieur et les élytres sont assez brusquement déclives tout à fait à l'extrémité.

Nyctobates sanguinicornis, n. sp.

Long. 15 mill. — Oblongus, postice leviter ampliatus, modice convexus, fuscus, vix nitidulus, femoribus (genubus exceptis) rubris; capite subtiliter punctulato, clypeo leviter transversim impresso, labro nitido, antennis sat validis, articulis 6 ultimis latioribus; prothorace transverso, antice angustato, lateribus postice sat abrupte sinuatis, dorso subtiliter punctato, medio longitudinaliter impresso, basi sat fortiter marginato et bisinuato, angulis posticis acutis; scutello triangulari, paulo depresso; elytris basi plicatis, ad humeros sat rotundatis, apice obtusis, fere triangularibus, dorso lineato-punctatis, intervallis planis, indistincte punctulatis; subtus nitidior, dense subtiliter punctatus, prosterno lato, mesosterno subtiliter carinulato, tibiis anterioribus medio leviter sinuatis, ante apicem fortiter angulatis, intus concavis.

Hab. Sumatra. — Ma collection.

Ressemble beaucoup au *Nyctobates gonager* Fairm., en diffère, outre la coloration des fémurs, par le corselet dont les côtés sont sinués avant la base, de manière à former un angle arrondi, et par les élytres non striées, n'ayant que des lignes de points avec les intervalles très plans.

Encyalesthus fuscatus, n. sp.

Long. 15 à 18 mill. — Oblongus, sat fortiter convexus, nigro-fuscus, nitidus; capite subtilissime punctulato, ver-

tice dense subtiliter strigosulo, sutura clypeali fortiter impressa, utrinque obliquata; antennis piceo-fuscis, basin prothoracis attingentibus ♂, parum brevioribus ♀, articulo 3° sequenti paulo longiore, 6 ultimis latioribus, ♀ magis transversis; prothorace subgloboso, lateribus antice cum angulis et margine antico rotundatis, dorso subtilissime dense punctulato, basi sat fortiter marginato et medio obsolete impresso; scutello ogivali, vix punctulato; elytris ad humeros obliquatis, apice obtuse acuminatis, parum fortiter punctato-striatis, punctis postice obsolete, striis 4^a 5^aque longe ante apicem conjunctis, intervallis planiusculis, vix perspicue punctulatis; subtus subtilissime punctulatus, prosterno inter coxas sat lato et impresso, postice oblique declivi et apice angulato, femoribus sat clavatis, tarsis subtus dense rufovillosis; ♂ prosterno et tibiis apice intus dense ac longe rufovillosis.

Hab. Sumatra. — Ma collection.

C'est, jusqu'à présent, le plus grand des *Encyalesthus*, bien distinct par les tibias du ♂ revêtus à la partie interne apicale de poils roux, ainsi que le milieu du prosternum.

On trouve aux îles Andaman une autre espèce également noire :

Encyalesthus andamanus, n. sp.

Long. 18 mill. — Præcedenti simillimus, sed magis niger, nitidior et levissime cœrulescens, antennis paulo brevioribus, prothorace minus convexo, magis subquadrato, dorso paulo inæquali, grosse ac inæqualiter punctato, margine antico fere recto, lateribus vix arcuatis, basi obsolete sinuatis, medio postice obsolete striato, basi utrinque parum sinuato, angulis magis acutis, scutello impresso, elytris similiter striatis, sed striis fortius punctatis, primis profundioribus, apice præsertim, intervallis convexiusculis, apice magis elevatis, lævibus, prosterno medio rugoso, inter coxas lato, leviter utrinque striato, apice late rotundato et planato, abdomine segmentis 3 primis subtiliter

striolatis, femoribus minus crassis, tibiis glabris, anterioribus basi arcuatis.

Hab. Ins. Andaman. — Ma collection.

Encyalesthus transversicollis, n. sp.

Long. 17 mill. — Oblongus, convexus, æneus, nitidus; capite subtilissime punctulato, labro sat magno, leviter sinuato, antennis prothoracis basin haud attingentibus, articulis 6 ultimis latioribus; prothorace valde transverso, elytris parum angustiore, lateribus antice rotundatis, basi vix sensim sinuatis, dorso subtiliter et inæqualiter punctulato, lateribus marginato, basi utrinque transversim fortiter impresso, angulis posticis acutiusculis; scutello brevi, obtuso, concavo; elytris ad humeros obliquis, postice vix ampliatis, sat fortiter striatis, striis valde punctatis, intervallis lævibus, convexiusculis, postice sat fortiter convexis; subtus paulo obscurior, fere lævis, prosterno medio subtiliter rugosulo, postice lato, fere truncato, segmentis ventralibus 3 primis basi subtiliter striolatis et lateribus impressis, 3^o medio bifoveolato, tibiis 4 anticis leviter arcuatis.

Hab. Bornéo. — Ma collection.

Cette espèce est bien distincte de ses congénères par son corselet fortement transversal, bien plus large, ayant en arrière, de chaque côté, une forte impression transversale.

Encyalesthus metallescens, n. sp.

Long. 12 mill. — Oblongus, postice vix ampliatus, convexus, æneus, nitidus; capite indistincte punctulato, antice transversim profunde impresso, antennis piceis, basin prothoracis attingentibus; prothorace subgloboso, lateribus antice cum angulis et margine antico rotundatis, dorso sat fortiter convexo, subtiliter sat dense punctato, medio stria longitudinali parum impresso, basi utrinque late leviter sinuato; scutello triangulari, lævi; elytris basi et apice leviter cœruleo et aurichalceo micantibus, dorso subtiliter striolato-punctatis, intervallis planis, subtilissime dense punc-

tulatis, epipleuris cœruleis; subtus fusco-metallescens, nitidus, fere lævis, femoribus clavatis.

Hab. Sumatra; Singapore (Raffray). — Ma collection.

Ressemble assez au *brevicornis*, mais plus étroit, avec le corselet ponctué différemment, ayant au milieu une faible strie longitudinale; les élytres sont plus finement striées, mais les stries sont plus ponctuées et les intervalles plus plans, plus lisses.

Necrobioides sulcaticollis, n. sp.

Long. 13 mill. — *Encyalestho metallescenti* simillimus, sed magis æneus, prothorace angustiore, magis globoso, medio sat fortiter sulcato, lateribus haud marginato, sed basi utrinque breviter sulcato et plicatulo, scutello haud impresso, elytris unicoloribus, similiter striatis, subtus cum pedibus violaceo tinctus, lævis.

Hab. Bornéo. — Ma collection.

Cette espèce, qui ressemble extrêmement à l'*Encyalesthus metallescens*, diffère de ses deux congénères par sa taille bien plus forte et son corselet sillonné sur le disque.

Necrobioides bicolor, n. sp.

Long. 8 mill. — *N. cœruleato* simillimus, sed paulo minor et elytris aliter coloratis, aurichalceis, paulo brevioribus, striis fortius punctatis, intervallis evidentius punctulatis, subtus cum pedibus fusco-ænescens, femoribus apice cœruleatis.

Hab. Bornéo occ.: Sambas (Dr. J. Bosscha). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Catapiestus simillimus, n. sp.

Cette nouvelle espèce ressemble extrêmement au *C. piceus* Perty, même taille, même coloration, sculpture des élytres presque semblable, mais le corselet est très différent. Au lieu d'être ponctué partout, ce sont seulement les impressions qui sont ponctuées et rugueuses, les parties convexes

sont très lisses et le disque est parcouru par un fort sillon, nettement tranché, au lieu d'un canal à bords obliques, les impressions sont plus profondes et plus nettement arrêtées; les épaules sont un peu obliques et non nettement angulées et le 7^e intervalle est un peu plus caréné. En dessous le mésosternum est plus lisse, moins impressionné, l'abdomen est bien moins ponctué, mais les premiers segments sont striolés et impressionnés, l'extrémité du 3^e et les deux derniers sont presque lisses. Les fémurs antérieurs sont tridentés en dessous avec les tibias moins fortement arqués. La coloration de cet insecte est plus noire et plus brillante.

Hab. Sumatra. — Ma collection.

On trouve aux îles Andaman une autre espèce de *Catapiestus* encore inédite :

Catapiestus piceiventris, n. sp.

Long. 11 à 14 mill. — Cet insecte est extrêmement voisin du *C. crenulicollis* Fairm., du Cambodge, en diffère par la tête plus plane, plus déprimée en avant, le corselet plus plan, plus densément ponctué, à large canal médian, la partie latérale moins convexe, le dessous du corps rougeâtre, l'abdomen plus déprimé; les fémurs antérieurs n'ont aussi qu'une très petite dent au milieu du bord inférieur; la massue des antennes est moins épaisse.

Hab. Ins. Andaman. — Ma collection.

Artactes marginicollis, n. sp.

Long. 8 mill. — *A. corrusco* simillimus, fere similiter coloratus, sed prothorace magis variegato, angulis anticis magis obtusis, capite medio haud carinulato, oculis valde distantibus, elytris minus brevibus, postice minus rotundatis, dorso fortius seriato-punctatis, punctis magis distantibus, cyaneis, purpureo fasciatis.

Hab. Sumatra. — Ma collection.

Artactes cyaneus, n. sp.

Long. 6 à 9 mill. — Rotundatus, convexus, cœruleus, nitidus, elytris limbo subtili aureo marginatis, abdomine apice pedibusque interdum viridi-aureo tinctis; capite parvo, oculis sat fortiter approximatis, sutura clypeali medio recta, utrinque sat abrupte angulata, antennis brevibus, fuscis, articulis 6 ultimis opacis, latioribus; prothorace brevissimo, antice sat emarginato, dorso subtiliter sat dense punctulato, angulis anticis valde rotundatis, margine postico ad scutellum truncato; scutello oblongo-triangulari, lævi; elytris basi late emarginatis, ad humeros producto-rotundatis, lateribus subtiliter marginatis, dorso lineato-punctatis, punctis apice tantum obsoletis, intervallis planis, lævibus, epipleuris latis, concavis; subtus subtiliter punctatus, abdomine subtiliter strigosulo.

Hab. Bornéo occ.: Sambah (Dr. J. Bosscha). — Huit exemplaires du Musée de Leide.

Cette espèce est bien reconnaissable à sa coloration uniforme avec un fin liséré doré autour des élytres qui sont orbiculaires.

On trouve à Hongkong une espèce très voisine:

*Artactes cyaneolimbatu*s, n. sp.

Long. 8 mill. — Præcedenti sculptura et forma valde affinis, sed obscure æneus, nitidus, elytris limbo tenui cœruleo marginatis; capite inter oculos punctato et sat fortiter oblonge impresso, antennis fuscis, apice modice dilatatis, prothorace minus brevi, punctulato, angulis anticis parum rotundatis, scutello ovato, cœrulescente, elytris punctato-lineatis, lineis fere elevatis; subtus cum epipleuris et pedibus sat cœrulescens, abdomine subtiliter dense strigosulo, segmentis 2 ultimis lævibus.

Hab. Hongkong. — Ma collection.

La sculpture des élytres est la même que chez l'espèce précédente, mais les lignes ne sont nullement enfoncées et paraissent plutôt un peu relevées.

Artactes guttifer Waterh.

(Entom. Monthly Magaz. XIV, 1877, p. 73).

Long. 9 mill. — Brevissime ovatus, convexus, æneus, nitidissimus, subtus piceo-fuscus, pedibus fusco-ænescentibus; capite paulo cupreo micante, oculis valde approximatis, fronte inter oculos obsolete impressa, clypeo medio convexiusculo, sutura clypeali transversa, utrinque obsolete angulata, antennis gracilioribus, articulis ultimis haud transversis; prothorace brevissimo, lævi, angulis anticis valde rotundatis; scutello fere triangulari-ovato, medio cyaneo; elytris ad humeros sat angulatis, medio vix ampliatis, utrinque seriebus 8 punctatis, punctis profundis sed distantibus, violaceis et annulo violaceo circumdati, apice haud obsolescentibus; subtus subtiliter punctulatus.

Hab. Java (Macklot). — Un exemplaire du Musée de Leide.

Bien remarquable par les points violets des élytres qui sont entourés d'un petit anneau violet comme chez la *Chrysomela bicolor* de Sicile.

Les trois premiers articles des tarsi ne sont pas aussi dilatés que chez le *nigritarsis*.

Artactes laevicollis, n. sp.

Long. 5 mill. — *A. corrusco* sat similis et fere similiter coloratus, sed capite subtilius punctulato, medio haud costulato, fronte angustiore, prothorace impunctato, elytris fortius seriato-punctatis, lateribus haud punctulatis, corpore subtus cum pedibus sat distinctus.

Hab. Sumatra (Deby). — Ma collection.

Ressemble extrêmement au *corruscus*, mais le corselet est imponctué, la tête plus finement ponctuée sans la petite ligne élevée longitudinale du vertex, le front est plus étroit, les angles postérieurs du corselet sont plus aigus, les points des séries élytrales plus gros et le prosternum est creusé longitudinalement au lieu d'avoir une strie de chaque côté.

Artactes cyaneicollis, n. sp.

Long. $6\frac{1}{2}$ mill. — *A. corrusco* valde similis, sed magis cyanescens, capite minus fortiter punctato, medio haud carinulato, margine antico leviter sinuato, prothorace similiter punctulato, sed angulis anticis minus rotundatis, elytris similiter punctato-seriatis, sed lævioribus, dorso aurulento, lateribus cœruleis, subtus cum pedibus rufus, prosterno inter coxas bistriato, sed apice latiore, mesosterno latius emarginato.

Hab. Sumatra (Deby). — Ma collection.

Artactes rutilans, n. sp.

Long. 5 mill. — Hemisphæricus, nitidissimus, capite prothoraceque cyaneis, elytris aureo-cupreolis, margine laterali cyaneo, intus cœrulescente, sutura cœrulescente, subtus cum pedibus rufus; capite dense subtiliter punctato, inter oculos transversim sulcato, antennis sat gracilibus, apice crassioribus, piceis; prothorace brevissimo, lateribus fortiter marginato-sulcato, angulis anticis rotundatis, margine postico medio rotundatim sublobato, angulis obtusis, dorso subtilissime dense punctulato; scutello minuto, triangulari, lævi; elytris punctato-seriatis, intervallis latis, planis, lævibus; subtus lævis.

Hab. Bornéo (S. Müller.) — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Distinct par sa petite taille, sa coloration et sa forme hémisphérique, avec les épaules moins saillantes que chez ses congénères. Les tarsi antérieurs sont peu dilatés.

Artactes lepidus Waterh.

(Entom. Monthly Magaz. XIV, 1877, p. 73).

Long. 4 mill. — Breviter ovalis, convexus, supra æneus, subtus piceus; fronte leviter convexa, fere lævi, clypeo subtilissime sat crebre punctulato; thorax longitudine fere triplo latiori, antice angustato, apice emarginato, angulis anticis obtusis, posticis rotundatis, basi rotundato; scutello

parce punctulato; elytris thorace parum latioribus, regulariter striato-punctatis, punctis haud approximatis, interstitiis lævibus, lateribus leviter arcuatis, apice rotundato; antennis pedibusque piceis.

Hab. Java. — Ma collection.

Le thorax est densément mais très obsolètement ponctué, les bords sont bleus. Les élytres ont des rangées régulières de points cuivreux assez écartés; les bords réfléchis sont bleus. Les tarsi antérieurs ne sont que faiblement dilatés.

Gauromaia femoralis, n. sp.

Long. 13 mill. — Oblonga, convexa, purpurina, nitida, capite paulo cœruleo tincto, subtus cum pedibus fusco-cœrulescens, femoribus ante apicem sat late rufis; capite subtiliter punctata, clypeo antice levissime sinuato, labro fere lævi, antennis fuscis, prothoracis medium superantibus; prothorace transverso, elytris angustiore, lateribus leviter arcuatis, angulis anticis sat rotundatis, dorso subtiliter punctato, disco bipunctato; scutello minuto; elytris oblongo-ovatis, ad humeros valde rotundatis, dorso punctato-substriatis, striis apice obsoletis, intervallis planatis, dense subtilissime punctulatis, suturam versus vix convexiusculis; subtus subtilissime coriaceus, abdomine dense subtiliter punctato, tarsi subtus dense rufo-villosis.

Hab. Singapore (Raffray). — Ma collection.

Forme du *dives*, mais taille plus petite et coloration des pattes bien différente.

Gauromaia semicyanea, n. sp.

Long. 9 mill. — Oblonga, convexa, nitida, capite prothoraceque cyaneis, elytris cuprino-purpureis, sutura et margine angustissime cœruleis; capite prothorace parum angustiore, sat subtiliter sat dense punctato, sutura clypeali lateribus valde impressa, labro producto, piceo, antennis fuscis, prothoracis medium haud attingentibus, articulis 5 ultimis latioribus; prothorace transverso, elytris

paulo angustiore, antice vix sensim angustiore, lateribus fere rectis, ante angulos anticos paulo arcuatis, dorso sat subtiliter sat dense punctato, lateribus et basi subtiliter marginato; scutello triangulari; elytris oblongo-ovatis, ad humeros oblique rotundatis, parum profunde striolato-punctatis, intervallis planiusculis, subtilissime coriaceis et punctulatis, striis extus et apice sat obsolescentibus; subtus cum pedibus cœruleus, nitidus, abdomine dense punctulato.

Hab. Sumatra. — Ma collection.

Forme du *dives* mais bien plus petit, de coloration un peu différente; la tête est proportionnellement plus large, plus ponctuée ainsi que le corselet qui, en outre, est plus étroit, plus finement rebordé et plus arrondi aux angles antérieurs.

Gauromaia janthina, n. sp.

Long. 8 à 10 mill. — Sat elongata, convexa, nitida, supra et pedibus cœruleo-janthina; capite prothorace parum angustiore, subtiliter punctato, labro fusco, sat producto; antennis fuscis, sat gracilibus, prothoracis basin attingentibus, articulis 7 ultimis gradatim paulo crassioribus; prothorace elytris angustiore, valde transverso, lateribus leviter arcuatis, angulis anticis sat rotundatis, dorso subtiliter dense punctato, basi transversim obsolete impresso, margine postico haud sensim utrinque sinuato; scutello triangulari, lævi; elytris oblongis, ad humeros valde rotundatis, punctato-lineatis, suturam versus vix substriatis, punctis et lineis apice obsoletis, intervallis planis, indistincte punctulatis; subtus dense punctulata.

Hab. Singapore (Raffray). — Ma collection.

Bien distincte par sa petite taille, sa forme plus étroite et sa coloration bleue en dessus.

Eucyrtus (Platycrepis) giganteus, n. sp.

Long. 24 mill. — Oblongo-ellipticus, sat convexus, nitidissimus, æneo-cupreolus, elytrorum intervallis vittula angusta sat pallide cœrulescente ornatis; capite sat lato,

brevissimo, clypeo brevi, late leviter sinuato, utrinque rotundato, epistomate declivi, transverso, picescente, labro lato, utrinque subtiliter asperato, antice medio densatim spinosulo; antennis validis, piceis, articulis 5 ultimis latis, cœrulescentibus; prothorace elytris parum angustiore, transverso, antice a medio angustato, dorso lævi, basi medio truncato, utrinque late sinuato et marginato, angulis posticis acutis, lateribus sat fortiter marginatis; scutello ogivali, polito; elytris amplis, postice vix ampliatis, sat subtiliter striatis, striis lævibus, intervallis planis, lævibus; subtus nitidus, fusco-purpurinus, cœruleo mixtus, pedibus fusco-cyaneis, purpureo tinctis, tibiis intus fulvo-villosis, femoribus 4 posticis medio et tibiis 4 posticis basi leviter arcuatis, prosterno inter coxas fortiter bisulcato, apice acuminato, tarsis latis, longe pilosis.

Hab. Sumatra. — Ma collection.

Cette espèce est le géant des *Platycrepis*; elle est en outre remarquable par la brièveté de la tête et par les élytres finement striées, à intervalles plans, parcourus par une étroite bande bleuâtre mal limitée.

Eucyrtus (Platycrepis) alternicolor, n. sp.

Long. 15 mill. — Oblonga, sat fortiter convexa, nitida, capite prothoraceque cœrulescentibus, cupreo mixtis, elytris longitudinaliter et alternatim cupreolis et cœrulescentibus, subtus cum pedibus fusca; capite subtiliter punctato, antice utrinque obsolete impressa, sutura clypeali obsoleta, antennis prothoracis basin fere attingentibus, articulis 6 ultimis latis, compressis, punctatis, opacis; prothorace elytris angustiore, valde transverso, antice angustato, lateribus valde marginatis, antice cum angulis fortiter rotundatis, basi vix sinuatis, dorso sat dense parum fortiter punctato, basi sat fortiter marginato et utrinque sinuato, angulis posticis acutis; scutello acute ogivali, lævi; elytris postice vix ampliatis, ad humeros rotundatis, valde convexis, striatis, striis sat tenuibus, fere lævibus aut potius vix perspicue punctulatis, intervallis fere planis, striis 2 externis

ad humeros abbreviatis; subtus cum pedibus fuscus, sat nitidus, vage metallescens, tibiis anticis arcuatis, tarsis crassis, anterioribus paulo latoribus, densius setosulis.

Hab. Sumatra. — Ma collection.

Ressemble assez au *P. latitarsis*, mais plus petit, plus oblong, plus convexe, d'une coloration assez différente, avec le corselet non impressionné à la base, les élytres à stries plus fines, à intervalles plus plans, et les tarses antérieurs moins dilatés, les 4 postérieurs seulement épaissis.

Eucyrtus trapezicollis, n. sp.

Long. 12 à 13 mill. — Oblongus, valde convexus, totus supra brunneo-æneus, metallicus; capite ante oculos brevi, dense sat subtiliter punctato, epistomate producto, ferrugineo, labro sat magno; antennis fuscis, prothoracis basin haud attingentibus, apice dilatatis, compressis; prothorace elytris haud angustiore, longitudine duplo latiore, trapeziformi, antice angustato, lateribus rectis, fortiter marginatis, angulis anticis sat productis, dorso dense sat subtiliter punctato, margine postico utrinque late sinuato, angulis sat acutis; scutello acute ogivali, polito; elytris oblongis, valde convexis, ad humeros angulatis, apice rotundatis, subtiliter striatis, striis vix impressis, vage purpurinis, apice haud obliterated, intervallis planissimis, lævibus; subtus fusco-purpurascens, nitidus, lateribus et abdomine subtilissime punctato, hoc lateribus impresso, pedibus fusco-æneis, mediocribus, tarsis subtus pilosis, anticis ♂ sat dilatatis.

Hab. Java. — Ma collection.

Cet insecte présente un faciès assez différent des autres *Eucyrtus* à cause de son corselet aussi large que les élytres, à côtés droits, et de ses élytres à stries extrêmement fines. Les tarses antérieurs un peu dilatés le rapprochent du groupe des *Platycrepis*.

Eucyrtus purpurinus, n. sp.

Long. 16 mm. — Oblongo-ovatus, sat convexus, supra purpurinus, valde nitidus, capite antice et elytris viridi-

micantibus; capite subtilissime punctulato, ante oculos brevissimo, epistomate brevissimo, rufo, labro sat magno, fusco, antice ciliato; antennis fuscis, prothoracis basin haud attingentibus, articulis 6—10 latis, compressis, punctatis; prothorace sat angustato, antice sat fortiter angustato, lateribus sat fortiter marginatis, arcuatis, margine antico medio rotundato, angulis rotundatis, dorso subtiliter sat dense punctulato, basi quadriimpreso, angulis sat fortiter acutis; scutello ogivali, plano; elytris ovatis, ad humeros sat rotundatis, postice leviter ampliatis, apice sat acuminatis, dorso sat tenuiter sed sat acute striatis, striis subtilissime punctulatis, intervallis planissimis, indistincte punctulatis; subtus cœruleus, punctulatus, abdomine densissime subtiliter punctato-stri-goso, prosterno inter coxas fortiter bisulcato, pedibus cyaneis, tarsis sat crassis, subtus dense rufo-pilosis.

Hab. Java. — Ma collection.

Voisin du *splendens*, mais la tête et le corselet sont différemment colorés, ce dernier est plus étroit, plus rétréci en avant, les angles postérieurs sont plus saillants, les élytres sont bien moins angulées aux épaules, les intervalles des stries sont très plans et les antennes sont plus courtes.

Eucyrtus laticollis, n. sp.

Long. 18 mill. — *E. purpurino* valde affinis, sed paulo major, supra aurichalceus, capite prothoraceque leviter purpurino tinctis, capite similiter brevissimo, clypeo late sinuato, epistomate late distincto, rufo, labro leviter sinuato, prothorace latiore, brevior, longitudine fere duplo latiore, elytris postice paulo magis ampliatis, apice similiter acuminatis, similiter striatis, intervallis lævioribus; subtus æneus, purpurino tinctus, abdomine lævior.

Hab. Malaisie. — Ma collection.

Plus grand que le *purpurinus*, d'une coloration un peu plus bronzée, distinct par l'épistôme largement découvert et le corselet bien plus large, moins rétréci en avant.

Eucyrtus subvittatus, n. sp.

Long. 14 mill. — Oblongus, convexus, nitidus, viridicœrulescens, prothorace transversim purpureo tincto, elytris purpureo vittulatis, striis viridibus; capite subtiliter dense punctato, summo supra oculos transversim læviore, antice convexiusculo, haud impresso, nec breviter truncato, antennis fuscis, medium prothoracis vix attingentibus, articulis 6 ultimis latis, transversis, punctatis; prothorace valde transverso, elytris angustiore, lateribus sat fortiter marginatis, antice cum angulis rotundatis, dorso sat dense parum tenuiter punctato, angulis posticis acutis, fere spinosis; scutello plano, sat late ogivali, lævi; elytris modice striatis, striis lævibus, intervallis planis, lævibus; subtus cum pedibus fuscus, sat nitidus, lævis, abdomine dense subtilissime strigosulo-punctato, prosterno inter coxas concavo, pedibus modice validis, tarsi subtus rufo-villosis.

Hab. Bornéo occ.: Sambas (Dr. J. Bosscha). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Ressemble à l'*E. pretiosus* pour la forme générale et notamment pour le corselet, mais la coloration est bien différente, les antennes sont plus courtes, les élytres sont nettement striées et les côtés du corselet ne sont pas distinctement sinués à la base.

Eucyrtus purpureotinctus, n. sp.

Long. 10 à 12 mill. — Oblongo-ellipticus, modice convexus, valde nitidus, cœruleus, elytris post basin purpureis, deinde gradatim æneo-auratis et ante apicem purpureis; capite subtiliter punctato, clypeo brevissimo, sutura profunda, epistomate fere verticali, rufescente, labro apice rufescente, antennis basin prothoracis fere attingentibus, articulis 6 ultimis latis, compressis, opacis; prothorace valde transverso, elytris paulo angustiore, antice paulo angustato, lateribus leviter rotundatis, basi sinuatis, angulis posticis sat acutis, extus paulo divaricatis, dorso subtilissime punctato.

tulato, lateribus sat fortiter marginato, basi pluriimpresso, haud marginato, bisinuato; scutello ogivali, polito; elytris basi truncatis, postice leviter ampliatis, ad humeros angulatis, sat fortiter striatis, striis obsolete punctulatis, basi et apice profundioribus, tribus externis ad humerum abbreviatis, intervallis vix convexiusculis, lævibus, postice paulo magis convexis; subtus cum pedibus fusco-metallescens, sat nitidus, pedibus sat brevibus.

Hab. Bornéo (S. Müller). — Quelques exemplaires du Musée de Leide.

Cet *Eucyrtus* est moins convexe que ses congénères, et sa forme rappelle plutôt celle des *Ceropria*; le corselet est tout à fait celui des grands *Eucyrtus*.

Eucyrtus pilipes, n. sp.

Long. 15 mill. — Ovato-oblongus, postice paulo ampliatus, valde convexus, fere gibbosus, nitidissimus, vernicatus, æneo-cupreolus, capite prothoraceque purpurino leviter tinctis, elytris cœrulescenti et purpurino micantibus, striis purpurinis; capite brevi, indistincte punctulato, epistomate et labri apice ferrugineis, antennis prothoracis medium vix attingentibus, articulis 6 ultimis latis, compressis, opacis; prothorace transverso, elytris angustiore, lateribus marginatis, sat rotundatis, basi paulo sinuatis, dorso indistincte punctulato, basi pluriimpresso et utrinque sinuato, angulis posticis acutis, anticis valde obtusis; scutello acute ogivali, lævi; elytris medio valde convexis, ad humeros sat angulatis, apice conjunctim obtusis, dorso tenuiter sed acute striatis, striis basi punctulatis, intervallis planissimis, politis; subtus fusco-ænescens, nitidus, cœrulescenti tinctus, lævis, pedibus fuscis, tibiis sat longe dense brunneo-pilosis, tarsis crassis, sat brevibus, haud dilatatis.

Hab. Bornéo (S. Müller). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Cet insecte est remarquable par ses élytres gibbeuses, rappelant celles des *Erotyles*, par sa coloration vernissée et ses tibias velus.

Eucyrtus multicolor, n. sp.

Long. 9 mill. — Ovatus, postice ampliatus, valde convexus, supra metallicus, æneo-viridis, capite cupreo mixto, prothorace vittis 2 transversis cupreis, elytris viridi et cupreo fere tessellatis; capite brevi, subtilissime punctulato, epistomate rufo, antennis fuscis, medium prothoracis vix superantibus, articulis 6 ultimis latis, compressis; prothorace valde transverso, elytris paulo angustiore, antice a basi angustato, lateribus parum arcuatis, marginatis, basi haud sinuata, utrinque late sinuata, angulis posticis acutiusculis, dorso subtilissime sat dense punctulato; scutello sat lato, ogivali, lævi; elytris ovatis, apice obtusis, medio valde convexis, parum profunde striatis, striis vix distincte punctulatis, apice profundioribus, 6—8 ad humeros abbreviatis, intervallis planis, lævibus; subtus fuscus, vage cœrulescens, modice nitidus, fere lævis, metapleuris dense punctatis.

Hab. Bornéo. — Ma collection.

Ressemble un peu, pour la forme générale, au *Platycrepis latitarsis* de Sumatra, mais plus petit, plus court, plus convexe, avec le corselet simplement rétréci en avant, les bords latéraux non sinués à la base, et les tarsi non dilatés.

Eucyrtus truncaticeps, n. sp.

Long. 10 mill. — *E. multicolori* valde similis, sed capite prothoraceque violaceis, purpureo tinctis, elytris longius fasciolatis, nitidioribus et paulo magis purpureo-cupreo tinctis; capite ante oculos brevissimo, epistomate et labro protensis, oculis extus fortiter angulatis, antennis fuscis, prothoracis basin fere superantibus, articulis 6 ultimis latis, compressis; prothorace sat parvo, elytris angustiore, longitudine duplo latiore, antice paulo angustato, lateribus fortiter marginatis, antice cum angulis rotundatis, postice levissime sinuatis, angulis posticis paulo exsertis, dorso subtiliter sat dense punctulato, basi utrinque biimpresso;

scutello lato, lævi; elytris sat late ovatis, postice paulo ampliatis, modice striatis, striis subtiliter punctatis, apice haud obsolescentibus, intervallis fere planis, lævibus; subtus cum pedibus fusco-cœrulescens, subtiliter punctatus, prosterno lævi, tibiis intermediis fere angulatim arcuatis.

Hab. Singapore (Raffray). — Ma collection.

Eucyrtus gibbosulus, n. sp.

Long. 5 mill. — Ovatus, valde convexus, gibbosulus, nitidus, capite prothoraceque virescenti-cœruleis, elytris basi et apice similiter coloratis, dorso paulo aurulentis et utrinque gradatim purpureis; capite subtilissime punctulato, sutura clypeali profunda arcuata, clypeo antice sinuato, cum labro rufescente, ore et antennis rufis, his apice obscurioribus, articulis 6 ultimis latoribus; prothorace elytris valde angustiore, fortiter transverso, lateribus fortiter marginatis, antice cum angulis rotundatis, basi paulo sinuatis, dorso dense punctato, postice transversim sat late impresso, basi haud marginato, angulis acutiusculis; scutello triangulari, lævi; elytris ovatis, medio valde convexis et ampliatis, apice obtusis, dorso substriato-punctatis, intervallis planis, subtilissime punctatis, 8^o apice breviter subcostato; subtus cum epipleuris fusco-piceus, modice nitidus, pedibus rufis.

Hab. Bornéo occ.: Sambah (Dr. J. Bosscha). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Cette espèce est remarquable par sa petite taille et sa forme gibbeuse un peu anormale.

Eucyrtus aurobasalis, n. sp.

Long. 7 mill. — Oblongus, convexus, cyaneus, nitidus, elytris basi cupreo-auratis, post basin transversim violaceomicantibus; capite subtilissime punctulato, antice transversim haud impresso, antennis sat gracilibus, articulis 5 ultimis latoribus, minus transversis; prothorace transverso, lateribus leviter rotundato et cum basi marginato, angulis posticis acutis, dorso vix perspicue punctulato; scutello sat

triangulari, lævi; elytris ovatis, subparallelis, sat fortiter punctato-striatis, punctis mox obsolescentibus, apice oblitteratis, intervallis convexiusculis, lævibus; subtus fusco-cœrulescens, pedibus fusco-cyaneis.

Hab. Nouvelle Guinée: Andai (v. Rosenberg). — Deux exemplaires du Musée de Leide.

Ressemble beaucoup à l'*E. carbunculus* Fairm., de Sumatra, en diffère par la taille plus faible, les antennes moins élargies à l'extrémité, le corselet bien plus court, plus fortement marginé sur les côtés et à la base, et par les élytres plus fortement striées, les points des stries bien plus marqués à la base, à intervalles convexes et par la coloration différente.

Eucyrtus fasciolatus, n. sp.

Long. 5 à 6 mill. — Oblongo-ovatus, modice convexus, valde nitidus, capite prothoraceque cœrulescentibus, hoc medio paulo aurulento, elytris cœrulescentibus, basi et postice aureo-cupreolis aut purpureis, medio et apice cyaneo-violaceo fasciolatis; capite punctato, ante oculos transversim utrinque impresso; prothorace elytris vix angustiore, longitudine plus duplo latiore, antice parum angustato, lateribus vix arcuatis, marginatis, dorso laxè punctato, basi medio paulo lobato; scutello minuto; elytris ad humeros recte angulatis, apice rotundatis, lineato-punctatis, punctis parum densatis, post medium obsoletis, linea suturali substriata; subtus cum pedibus fuscus.

Hab. Java (Blume), Bornéo (Schwaner). — Deux exemplaires du Musée de Leide.

Ressemble assez à l'*E. aurobasalis*, mais le corselet est bien plus large, plus court, avec les côtés à peine arqués et bien moins marginés; la coloration rappelle beaucoup celle du *Pseudeumolpus castaneipes*.

Eucyrtus semipunctatus, n. sp.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ mill. — *E. fasciolato* sat affinis, sed paulo angustior, capite prothoraceque obscure æneis, modice ni-

tidis, elytris nitidioribus, cœruleo et purpureo fasciolatis, medio cyaneo transverse signatis; capite prothoraceque dense punctatis, sutura clypeali utrinque valde obliquata et profunda; prothorace transverso, elytris vix angustiore, antice angustato, lateribus leviter arcuatis, angustissime marginatis, basi transversim impressiusculo et lævissime utrinque sinuato, angulis posticis acute rectis, anticis parum exsertis; scutello lævi, obtuso, fere transverso; elytris ad humeros sat angulatis, oblongis, striato-punctatis, striis parum profundis, suturam versus et præsertim apice magis impressis, intervallis planis, subtilissime punctulatis, apice paulo convexiusculis; subtus cum pedibus et epipleuris fusca, vix cœrulescens, sat dense punctata.

Hab. Java (Blume). -- Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Certains *Eucyrtus* paraissent ressembler à des *Lina*, mais cette espèce ressemble plutôt à une *Phratora*; elle est remarquable par la ponctuation serrée de la tête et du corselet, et par les bords latéraux de ce dernier qui sont à peine marginés. La coloration ressemble beaucoup à celle du *fasciolatus*.

Eucyrtus oblongulus, n. sp.

Long. $8\frac{1}{2}$ mill. — Oblongus, convexus, postice levissime ampliatus, nitidus, fuscus, paulo cœrulescens, elytris æneo-viridibus, vage purpurino micantibus; capite minore, ante oculos brevi, subtiliter dense punctulato, inter oculos transversim sulcato, his sat approximatis, extus productis, antennis prothoracis basin attingentibus, articulis 6 ultimis gradatim valde latioribus; prothorace transverso, elytris paulo angustiore, lateribus sat fortiter marginatis, antice cum angulis rotundatis, dorso polito, postice medio transversim impresso et utrinque foveolato; scutello sat magno, ogivali, plano; elytris oblongo-ovatis, ad humeros sat rotundatis, modice striatis, striis subtilissime punctulatis, extus minus impressis, 2 primis paulo profundioribus, intervallis planatis, subtilissime punctulatis; subtus lævis,

abdomine indistincte punctulato, tibiis basi leviter arcuatis, apice intus cum femoribus fulvo-pilosis, tarsis sat latis, subtus dense pilosis.

Hab. Singapore (Raffray). — Ma collection.

Cet *Eucyrtus* se distingue par sa forme oblongue, un peu parallèle, sa tête plus petite, très courte en avant, ses yeux plus rapprochés et plus saillants en dehors; les élytres sont presque unicolores, n'ayant que de faibles reflets purpurins, et les tarsi sont larges, surtout les antérieurs.

Eucyrtus subcostatus, n. sp.

Long. 9 mill. — Sat elongatus, subparallelus, sat convexus, supra cœruleus, nitidus, subtus fuscus, pedibus testaceo-castaneis; capite dense punctulato, sutura clypeali profunda, clypeo antice leviter sinuato, labro distincto, rufescente, antennis rufo-piceis, medium prothoracis fere superantibus, articulis 6 ultimis sat gradatim modice latioribus; prothorace elytris angustiore, sat transverso, antice parum angustato, lateribus vix arcuatis, undulato-marginatis, dorso dense sat fortiter punctato, basi medio leviter arcuatim lobato et transversim anguste impresso; scutello minuto; elytris oblongis, parallelis, ad humeros parum rotundatis, punctato-seriatis, vix substriatis, externis magis impressis, intervallis planis, fere indistincte punctulatis, 5^o 6^oque costulatis, 4^o apice breviter costulato, spatio marginali lævi; subtus sat fortiter punctatus.

Hab. Bornéo: Sintang. — Un seul exemplaire du Musée de Leide, présenté par M. G. Severin.

Cette espèce est remarquable par sa forme très oblongue, presque parallèle, et ses élytres carénées en dehors, ainsi que par la coloration des pattes.

Eucyrtus protensus, n. sp.

Long. 7 mill. — Oblongus, subparallelus, modice convexus, cœruleus, nitidus, subtus cum pedibus, ore et antennis rufus; capite sat fortiter dense, clypeo subtiliter punctato, margine antico leviter sinuato, antennis sat

gracilibus, prothoracis basin fere attingentibus, articulis 6 ultimis modice dilatatis; prothorace elytris vix angustiore, valde transverso, antice haud angustiore, lateribus modice marginatis, antice leviter rotundatis, basi vix sensim sinuatis, dorso dense sat subtiliter punctato, angulis anticis valde obtusis, basi sat marginato et utrinque sat sinuato, angulis acutiusculis; scutello fere concavo; elytris oblongis, ad humeros sat angulatis, modice striato-punctatis, stria suturali paulo magis impressa, intervallis planis, dense subtiliter punctatis, basi post scutellum utrinque impressione obliqua sat obsolete signatis; subtus dense sat subtiliter punctatus, prosterno lateribus fortius punctato, inter coxas utrinque leviter striato.

Hab. Singapore (Raffray). — Ma collection.

Forme du *subcostatus*, mais outre la différence de taille le corselet n'est pas denticulé latéralement, ni impressionné à la base, les élytres sont un peu plus courtes et les pattes bien moins robustes.

Eucyrtus vittulatus, n. sp.

Long. 5 mill. — Oblongo-ovatus, postice paulo ampliat, sat fortiter convexus, nitidus, capite prothoraceque purpureo, viridulo et auroso mixtis, elytris purpureis, prope suturam, disco et ad marginem viridulo-vittatis; capite sat parvo, subtiliter dense punctato, inter oculos profunde transversim sulcato, clypeo brevi, epistomate producto, antennis prothoracis medium paulo superantibus, basi rufis, apice fuscis et dilatatis; prothorace elytris paulo angustiore, longitudine fere duplo latiore, antice leviter angustato, lateribus antice cum angulis rotundatis, sat anguste marginatis, dorso subtilissime dense punctulato, margine postico medio truncato et utrinque vix sinuato; scutello sat magno, ogivali, punctulato; elytris ovato-oblongis, ad humeros sat angulatis, fortiter convexus, leviter striatis, striis indistincte punctulatis, intervallis planis, subtiliter dense punctatis; subtus cum pedibus æneus, subtiliter punctatus, prosterno inter coxas convexiusculo.

Hab. Sumatra. — Ma collection.

Ressemble assez au *gibbosulus*, mais moins convexe; le corselet est très différent ainsi que les antennes.

Eucyrtus immarginatus, n. sp.

Long. 7 mill. — Oblongus, convexus, cœruleus, nitidus, elytris vix virescenti-cœruleis; capite dense punctato, antice arcuatim impresso, margine antico fere truncato, antennis sat gracilibus, basi rufescentibus, apice fuscis et parum dilatatis, articulo 3^o sequenti paulo longiore; prothorace transverso, elytris vix angustiore, antice parum angustato, lateribus parum arcuatis, angustissime marginatis, dorso sat subtiliter dense punctato, postice transversim paulo impresso, margine postico utrinque vix sinuato, angulis posticis brevissime acutiuseculis; elytris ad humeros sat fortiter angulatis, postice vix sensim ampliatis, punctato-striatulis, striolis primis apice magis impressis, intervallis planatis, subtilissime dense punctulatis; subtus cum pedibus fuscus, subtiliter punctulatus, prosterno inter coxas sat fortiter canaliculato.

Hab. Bornéo (S. Müller). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Cette espèce est remarquable par son corselet à peine marginé latéralement et par ses antennes grêles.

Eucyrtus picicornis, n. sp.

Long. 6 à 7 mill. — Præcedenti simillimus, similiter coloratus, et tantum antennis piceolis, articulo 3^o sequenti haud sensim longiore, prothorace paulo fortius et minus dense punctato, basi inopius ad marginem leviter impresso, angulis anticis magis rotundatis, postice magis acutis, corpore subtus cum pedibus rufulo et prosterno lateribus fortiter punctato et inter coxas haud canaliculatus sat distinctus.

Hab. Bornéo (S. Müller). — Trois exemplaires du Musée de Leide.

Eucyrtus neomidinus, n. sp.

Long. 5 mill. — Oblongus, convexiusculus, cyaneus, nitidus, subtus cum pedibus et ore rufo-piceus; capite subtiliter dense punctato, sutura clypeali medio vix distincta, antennis gracilibus, medium prothoracis valde superantibus, fuscis, basi rufescentibus, articulis 7 ultimis paulo dilatatis, articulo 3^o secundo et quarto haud sensim latiore, ceteris paulo serratis; prothorace elytris vix angustiore, valde transverso, antice angustato, lateribus leviter arcuatis, dorso subtiliter dense punctato, lateribus angustissime marginato, margine postico vix utrinque sinuato, medio paulo lobato, angulis posticis fere obtusis; scutello triangulari, fere lævi; elytris ovatis, ad humeros sat angulatis, punctato-striatis, striis sat impressis, intervallis vix convexiusculis, subtilissime punctulatis; pectore lævi, prosterno inter coxas convexiusculo, abdomine sat fortiter dense punctato.

Hab. Bornéo: Moeara teweh (J. Semmelink). — Trois exemplaires du Musée de Leide.

Ressemble un peu aux deux espèces précédentes, mais bien plus petite, plus elliptique, avec le corselet plus rétréci en avant, les élytres plus courtes et la massue antennaire formée par 7 articles.

Pseudeumolpus simulator, n. sp.

Long. 16 mill. — Oblongus, sat fortiter convexus, aurichalceus, nitidus, capite prothoraceque late purpurino tinctis, elytris leviter et longitudinaliter purpurino micantibus; capite sat lato, subtilissime punctato, inter antennas biimpresso, sutura clypeali sat impressa, antennis fuscis, brevibus, medium prothoracis vix attingentibus, articulis 6 ultimis gradatim latoribus; prothorace elytris angustiore, transverso, antice leviter angustato, lateribus parum arcuatis, angulis anticis fere rotundatis, dorso sat subtiliter sat dense punctato, disco levissime quadrifoveolato, basi late bisinuato, angulis acute rectis; scutello triangulari, lævi; elytris oblongis, ad humeros paulo obliquatis, postice haud

sensim ampliatis, apice obtusis, dorso punctato-striatis, striis parum profundis, intervallis lævibus, planiusculis; subtus fusco-cœrulescens, minus nitidus, abdomine subtiliter dense punctato, basi fortius, apice fere lævi, segmento penultimo rufescente, pedibus validis, nitidis, femoribus anticis sat inflatis, subtus dente lato, acuto armatis, tibiis anticis leviter arcuatis.

Hab. Bornéo occ.: Sambas (Dr. J. Bosscha). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Cet insecte est un des plus grands du genre; il ressemble assez à un *Gauromaia* par sa tête un peu large et son corselet peu marginé latéralement. Très voisin du *purpuricollis*, mais avec le corselet moins large, différemment coloré, n'ayant que 2 faibles impressions sur le disque, moins fortement marginé sur les côtés et le dessous du corps bleuâtre; les élytres sont un peu plus étroites et un peu moins convexes.

Pseudeumolpus picticollis, n. sp.

Long. 14 mill. — Præcedenti valde affinis, sed minor et brevior, prothorace sensim brevior, lateribus fortius marginato, margine antico magis recto, dorso magis purpureo, viridi et auroso longitudinaliter fasciolato, elytris paulo brevioribus, striis minus impressis et postice oblitteratis, intervallis magis planatis, subtiliter punctulatis, minus nitidis, subtus magis cyanescens, femoribus anticis similiter armatis.

Hab. Singapore (Raffray). — Ma collection.

Pseudeumolpus decretus, n. sp.

Long. 9 à 10 mill. — Præcedenti simillimus sed multo minor et paulo angustior, antennis minus latis, articulis 5 ultimis tantum dilatatis, prothorace paulo angustiore, angustius marginato, angulis posticis minus productis, elytris nitidioribus, sulco marginali anguste cœruleo, usque ad apicem prolongato; subtus cum pedibus fuscus, leviter

violascens, lævis, femoribus anticis acute dentatis, tibiis basi leviter arcuatis.

Hab. Singapore (Raffray). — Ma collection.

Pseudeumolpus purpuricollis, n. sp.

Long. 16 mill. — Oblongus, postice parum ampliatus, sat convexus, nitidus, capite prothoraceque purpureis, cœruleo mixtis, elytris æneis, cœruleo angustissime marginatis; capite subtiliter punctulato, sutura clypeali medio parum distincta, utrinque antice angulata, evidentiore et extus plicatulo, antennis fuscis, medium prothoracis paulo superantibus, articulis 6 ultimis valde transversis, dense punctatis; prothorace transverso, elytris angustiore, antice paulo angustato, lateribus leviter arcuatis et anguste marginatis, dorso vix perspicue punctulato, medio impressiusculo, basi subtiliter marginato et utrinque late sinuato, angulis posticis acutiusculis, anticis obtusis; scutello sat brevi, late ogivali, lævi; elytris medio sat convexis, ad humeros sat rotundatis, apice obtusis, sat subtiliter lineato-punctatis, suturam versus vix substriatulis, intervallis planis, suturam versus vix convexiusculis, lævibus; subtus cyaneus, nitidus, paulo purpureo tinctus, pedibus fuscis, nitidis, femoribus anticis subtus ante apicem dente valido armatis, et tibiis leviter arcuatis, tarsis subtus dense fulvopilosis.

Hab. Sumatra. — Ma collection.

Chez cet insecte et les suivants le corselet n'est pas défléchi sur les côtés; il est conformé comme chez les grands *Eucyrtus*, mais les fémurs antérieurs sont armés en dessous d'une forte dent.

Pseudeumolpus polychromus, n. sp.

Long. 11 mill. — *P. purpuricollis* forma et prothoracis colore valde affinis sed multo minor, elytris purpureo, violaceo, cœruleo et paulo auroso longitudinaliter ac breviter fasciolatis, basi magis cœruleis, prothorace paulo brevior, antice late sinuato, angulis minus rotundatis,

dorso subtilius punctato, postice utrinque foveolis 2 valde approximatis, postica paulo transversa, ad marginem anticum utrinque impressiusculo, scutello multo minore; subtus fusco-cœrulans, leviter purpurino tinctus, femoribus gracilibus.

Hab. Singapore (Raffray). — Ma collection.

En outre des différences ci-dessus détaillées, les fémurs postérieurs ne sont pas, comme chez le *purpuricollis*, obtusément angulés en dessous au milieu.

Pseudeumolpus Raffrayi, n. sp.

Long. 10 mill. — Præcedenti sat similis, sed paulo minor, magis convexus, capite prothoraceque purpureis, elytris basi cœruleis, deinde transversim et alternatim purpureo, auroso et cyaneo fasciolatis; capite dense minus subtiliter punctato, prothorace paulo angustiore, fortius punctato, lateribus magis rotundatis, dorso basi medio fere lobato et crassius marginato, disco haud foveolato, scutello majore, elytris evidentius punctatis, subtus magis piceus, abdomine subtiliter punctulato, femoribus anticis similiter armatis.

Hab. Singapore (Raffray). — Ma collection.

Pseudeumolpus rotundicollis, n. sp.

Long. 9 mill. — Oblongus, sat fortiter convexus, postice levissime ampliatus, capite prothoraceque violaceis, leviter purpureo micantibus, elytris cupreolis, lateribus magis viridi-aurichalceis, striis virescentibus; capite minus lato, subtilissime punctulato, basi fere lævi, antice impressiusculo, antennis angustioribus et paulo longioribus; prothorace transversa, elytris angustiore, lateribus rotundatis, angulis anticis fere rotundatis, margine antico late arcuato, dorso vix perspicue punctulato, margine postico medio obtusissime angulato, angulis posticis fere rectis; scutello sat minuto; elytris ovatis, basi truncatis, ad humeros rotundatis, substriato-punctatis, striis parum impressis, apice obsoletis, intervallis planiusculis, dense sub-

tilissime punctulatis; subtus cum epipleuris et pedibus fuscus, leviter cœruleo et purpurino tinctus, femoribus anticis dente minus lato, acuto armatis.

Hab. Singapore (Raffray). — Ma collection.

Pseudeumolpus semiarmatus, n. sp.

Long. 10 mill. — Oblongus, sat convexus, nitidus capite prothoraceque viridulis, elytris aurichalceis, margine laterali angustissime viridulo; capite sat lato, antice late rotundato, sat dense subtiliter punctato, medio late levissime impresso, antennis brevibus, articulis 5 ultimis latioribus; prothorace transverso, elytris angustiore, antice vix angustiore, lateribus sat rotundatis, dorso subtilissime punctulato, lateribus et basi sat subtiliter marginato, angulis anticis obtusis; scutello sat minuto, lævi; elytris oblongo-ovatis, ad humeros rotundatis, apice obtusis, dorso substriatulo-punctatis, striis extus et apice minus impressis, intervallis planiusculis, fere lævibus; subtus fusco-cœrulescens, modice nitidus, fere lævis, abdomine dense subtiliter punctato, apice fere lævi; femoribus anticis ♂ dente sat acuto subtus armatis, ♀ inermibus.

Hab. Sumatra: Fort de Kock. — Ma collection.

Ressemble au *rotundicollis*, la tête et le corselet sont verdâtres au lieu d'un beau bleu, les stries des élytres sont moins fortes et moins ponctuées, les intervalles plus plans; en outre les 2 sexes sont assez différents, le ♂ ayant une dent aiguë aux fémurs antérieurs, qui sont inermes chez la ♀, et les angles postérieurs du corselet formant une très petite épine, tandis qu'ils sont simplement droits chez la ♀.

Pseudeumolpus castaneipes, n. sp.

Long. 5 mill. — Ovatus, valde convexus, valde nitidus, capite viridi-æneo, prothorace purpureo, cœruleo et cupreo mixto, elytris purpureis, basi, ante et post medium transversim viridi-metallico fasciolatis, medio vitta violacea transversali ornatis; capite punctato, inter oculos

late leviter impresso, palpis et antennis rufis, his brevibus, prothoracis medium haud attingentibus, articulis 4 ultimis latis, clavatis, dense punctatis, opacis; prothorace valde transverso, elytris paulo angustiore, antice sat angustato, lateribus antice sat fortiter rotundatis, subtiliter marginatis, dorso punctulato, basi vix marginato, angulis posticis acutiusculis, anticis obtusissimis; scutello minuto, apice obtuso; elytris valde convexis, sat fortiter substriato-punctatis, intervallis fere planis, lævibus; subtus cum pedibus piceus, femoribus anticis inflatis, subtus dente valido armatis, tibiis anticis arcuatis.

Hab. Bornéo occ.: Sambas (Dr. J. Bosscha). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Cette petite espèce présente plutôt la coloration des *Eucyrtus* avec les bandes pourpres et violettes, se fondant sur les bords, aux élytres; la tête est largement impressionnée et les côtés du corselet sont peu déclives.

Pseudonautes, n. g.

Ce nouveau genre, dont le faciès rappelle celui des *Nautes* d'Amérique, diffère des *Eucyrtus* par les antennes qui sont longues, dépassant notablement la base du corselet, grêles, avec les 5 ou 6 derniers articles un peu élargis mais non transversaux, le 3^e un peu plus long que le 4^e. La tête est assez large, les yeux très écartés, moins saillants. Le corselet est large, très court, étroitement rebordé. La poitrine et les pattes sont comme chez les *Eucyrtus*, mais les articles des tarse antérieurs sont assez larges, courts, le 4^e bilobé à tous les tarse et pas plus étroit que le précédent.

Pseudonautes vagevittatus, n. sp.

Long. 11 à 12 mill. — Ovato-oblongus, modice convexus, capite prothoraceque æneis, purpureo tinctis aut cupreo-purpureis, virescenti mixtis, elytris viridi-metallicis, sutura, vitta discoidali et margine purpureis; capite sat lato, parum brevi, sutura clypeali medio impressa, clypeo

sat magno, dense strigoso-punctato; prothorace brevi, longitudine plus duplo latiore, elytris paulo angustiore, antice paulo angustato, lateribus leviter arcuatis, dorso sat fortiter parum dense punctato, lateribus et basi sat tenuiter marginato, postice utrinque transversim impresso; scutello sat lato, apice angulato, purpureo, lævi; elytris ovato-oblongis, basi truncatis, striato-punctatis, punctis apice obsolescentibus, intervallis vix convexiusculis, lævibus; subtus similiter coloratus, nitidus, lateribus et abdomine transversim cupreolis, hoc subtiliter dense punctato, pedibus viridi et cupreo mixtis.

Hab. Bornéo occ.: Sambas (Dr. J. Bosscha), Java (Blume). — Deux exemplaires du Musée de Leide. — (Sumatra, collection Dohrn).

Cet insecte ressemble un peu à une *Ceropria*: il est bien distinct par son corselet large et court, finement rebordé, très ponctué et par sa tête assez grosse. La coloration du dessous du corps est assez remarquable.

Pseudonantes helopinus, n. sp.

Long. 8 à 9 mill. — Ovato-oblongus, sat convexus, viridi-æneus, nitidus, leviter purpurino tinctus, elytris magis aurichalceis, plus minusve purpureo et cœruleo vittulatis; capite dense punctato, sutura clypeali utrinque profundiore, antennis fusco-piceis, medium corporis haud attingentibus, apicem versus parum incrassatis, articulo 3^o quarto parum longiore; prothorace elytris angustiore, valde transverso, longitudine plus duplo latiore, antice paulo angustato, lateribus leviter rotundatis, angulis anticis parum obtusis, dorso sat dense parum subtiliter punctato, postice transversim fere obsolete impresso, margine postico utrinque late levissime sinuato, angulis subrectis; scutello ogivali, lævi; elytris ovato-oblongis, fortiter punctato-striatis, striis postice profundioribus, intervallis convexis, lævibus, postice paulo magis convexis; subtus fusco-violascens, lateribus cum epipleures virescens et purpurino mixtus, pedibus aurichalceis, prosterno an-

gusto, abdomine subtilissime punctato et lateribus leviter impressiusculo.

Hab. Singapore (Raffray). — Ma collection.

Cleomis, n. g.

Ce nouveau genre se rapproche des *Cyrtosoma* et des *Cnodalon* par la conformation du mésosternum qui est fourchu avec les bords saillants, angulés en avant; mais les yeux sont plus gros, plus saillants en dehors, un peu plus rapprochés sur le front; les antennes, assez courtes, ont les six derniers articles élargis; le corselet, très court, a les angles antérieurs nullement saillants, très arrondis; les élytres sont fortement rebordées à la base; les 4 tibias antérieurs sont légèrement arqués. La saillie intercoxale est assez large, obtuse; le métasternum n'est pas plus court que celui des *Cnodalon*. Le faciès de cet insecte est celui d'une très petite *Camaria*.

Cleomis violaceipes, n. sp.

Long. 9 à 10 mill. — Oblongo-ovatus, convexus, æneus, valde nitidus, pedibus purpureis, cyaneo mixtis; capite brevi, parce punctato, inter oculos transversim sulcatulo et utrinque impressiusculo, his paulo emarginatis, labro lato, brevi, palpis maxillaribus articulo ultimo lato, oblique securiformi; antennis prothoracis basin vix attingentibus, articulis 6 ultimis latioribus, ultimo longiore; prothorace elytris angustiore, longitudine duplo latiore, antice haud angustato sed lateribus cum angulis rotundatis, his cum basi fortiter marginatis, antice lateribus tantum marginatis, basi fortiter bisinuato, angulis posticis acutiusculis, dorso fere lævi, ad latera paulo impressiusculo; scutello cupreo aut violaceo, triangulari, lævi; elytris ad humeros paulo elevatis, sat rotundatis, postice vix ampliatis, apice obtusis, dorso punctato-lineatis, lævibus, margine laterali fere sulcato et apice intus subtiliter carinulato; subtus fere lævis, genubus cyaneis.

Hab. Bornéo (S. Müller et Schwaner); Bornéo occ.: Sambas (Dr. J. Bosscha). — Trois exemplaires du Musée de Leide.

Cleomis opaculus, n. sp.

Long. 12 mill. — Oblongo-ovatus, convexus, æneus, capite prothoraceque nitidis, elytris parum nitidulis; capite subtiliter punctulato, antennis medium prothoracis attingentibus; prothorace elytris angustiore, valde transverso, lateribus sat marginatis, antice cum angulis rotundatis, postice leviter sinuatis, dorso sat subtiliter sat dense punctato, angulis posticis sat acute productis; scutello planiusculo, impresso; elytris ad humeros rotundatis, postice vix ampliatis, dorso substriato-punctatis, striis vix impressis, punctis apice obsolescentibus, intervallis planis, indistincte punctulatis, 8^o apice sat acute carinato; subtus fusco-metallescens, subtiliter punctulatus, pedibus valde nitidis, tibiis antice levissime arcuatis.

Hab. Singapore (Raffray). — Ma collection.

Bien distinct du précédent par la taille et la coloration à peine brillante des élytres.

Asbolodes, n. g.

Corpus ovatum, subgibbosum. Epistoma antennarum basin superans. Prothorax elytris angustior, lateribus obsolete undulatus. Elytra sat brevia, humeris obliquis, valde elevatis. Oculi a prothorace distantes. Antennæ prothoracis basin fere attingentes, articulis 4 ultimis dilatatis. Scutellum ogivale. Epipleuræ basi sat latæ, postice paulatim angustiores. Processus intercoxalis latus, valde obtusus. Mesosternum parum concavum, lateribus haud elevatis, prosternum inter coxas sat latum, impressum, apice brevissime dentiforme. Pedes validi, sat magni.

Ce nouveau genre est très voisin des *Cyrtosoma* dont il a bien le faciès, mais l'épistôme n'est pas aussi court, les 4 derniers articles des antennes sont dilatés, le mésosternum est peu impressionné et la saillie prosternale très courte.

Asbolodes humerosus, n. sp.

Long. 10 mill. — Ovatus, convexus, elytris fere gibbosis, fuscus, subopacus, elytris vix nitidulis, humeris politis, nitidis; capite sat lato, dense rugosulo-punctato, clypeo arcuatim impresso, labro lato, brevi, oculis transversis, sat convexis; antennis basi sat gracilibus, articulo 3^o quarto vix longiore; prothorace transverso, elytris valde angustiore, transverso, antice paulo ampliato et cum angulis rotundato, margine antico haud emarginato, fere recto, lateribus postice levissime sinuatis, indistincte undulatis, dorso dense sat subtiliter punctato, basi marginato et utrinque sinuato, angulis rectis; scutello plano, late ogivali, lævi; elytris brevibus, ad humeros obliquatis et fortiter plicato-elevatis, postice paulo ampliatis, apice obtusis, dorso leviter punctato-substriatis, intervallis planissimis, lævibus; subtus lævis, metapleuris parallelis, pedibus punctato-rugosis, femoribus apice sat clavatis, tibiis anterioribus apice paulo incurvis, femoribus posticis elytrorum apicem attingentibus, tarsis subtus pilosis, articulo ultimo ceteris conjunctis æquali.

Hab. Bornéo (Schwaner). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Le faciès de cet insecte est celui du *Cyrtosoma atrum* Dej. mais le chaperon est bien moins court, l'épistôme indistinct, les angles antérieurs du corselet sont bien plus arrondis, les épaules fortement relevées, le mésosternum à peine creusé.

Camaria malayana, n. sp.

Long. 25 mill. — Oblonga, convexa, postice leviter ampliata, æneo-metallica, nitida, capite prothoraceque paulo minus nitidis; capite dense sat subtiliter punctato, sutura clypeali sat impressa, medio recta, utrinque arcuatim fortiter antice producta, margine antico late obsolete sinuato, labro antice fortiter punctato et ciliato, antennis prothoracis basin vix attingentibus, piceis, articulis 4 ultimis

lterioribus, ferrugineis, 8° nono paulo longiore; prothorace elytris valde angustiore, valde transverso, antice parum attenuato, lateribus fere rectis, subtiliter marginatis, angulis anticis rotundatis, dorso sat subtiliter, lateribus dense, disco laxè punctato, basi utrinque leviter longe sinuato, utrinque sat subtiliter marginato, angulis posticis sat retrorsum acutis; scutello lævi, apice rotundato; elytris oblongis, ad humeros angulatis, postice leviter ampliatis, apice sat acutis, dorso fortiter punctato-striatis, striis latis, opacis, punctis densatis, intervallis subtiliter alutaceis, modice convexis, basi, extus et præsertim apice magis convexis; subtus vix nitidula, abdomine dense subtiliter coriaceo, pedibus validis, rugoso-punctatis, articulo ultimo longissimo.

Hab. Bornéo (Schwaner). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Ressemble à la *C. spectabilis*, de la Chine, en diffère par le corselet finement et moins densément ponctué, moins rétréci en avant, les élytres à stries ponctuées, le dessous du corps presque mat et les tarses plus robustes.

Amarygmus pulchridorsis, n. sp.

Long. 9 mill. — Ovatus, convexus, nitidus, aurichalceus, capite prothoraceque cœruleo et purpurino mixtis, elytris basi et apice, medio latius cyaneo transversim fasciatis, his fasciis purpurino marginatis; capite subtiliter punctato, antice transversim sulcato, oculis valde approximatis, antennis fuscis, sat gracilibus, corporis medium attingentibus, apicem versus parum crassioribus, articulo 3° quarto dimidio longiore; prothorace basi elytris haud angustiore, valde transverso, antice valde angustato, lateribus a basi arcuatis, dorso subtiliter dense punctato, basi vix bisinuato et obsolete biimpresso; scutello acute ogivali, indistincte punctulato; elytris sat breviter ovatis, punctis grossis seriatis, suturam versus vix substriatis, serie marginali basi et apice fere obsoleta, intervallis subtilissime sat dense punctulatis; subtus cum epipleuris et pedibus

piceus, nitidus, abdomine basi subtiliter striolato, pectore lævi, pedibus sat magnis, tibiis posterioribus apice leviter incurvis.

Hab. Bornéo (S. Müller). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Forme et sculpture du *convexus* Pasc., d'Australie, mais un peu plus court et plus convexe, d'une coloration très différente, avec les pattes plus grandes, les tibias postérieurs arqués à l'extrémité.

Amarygmus iridipennis, n. sp.

Long. 10 mill. — Ovato-ellipticus, convexus, nitidus, capite viridi-metallico et purpurino mixto, prothorace viridi-metallico, transversim purpurino fasciato, elytris vittulis brevibus cœruleo-viridibus et purpureis alternatim ornatis; capite dense subtiliter punctato, antice transversim sulcato, oculis modice approximatis, antennis gracilibus, fuscis, medium corporis paulo superantibus, articulo 3^o duobus sequentibus conjunctis fere æquali; prothorace brevi, longitudine duplo latiore, elytris parum angustiore, antice valde angustato, sat subtiliter sat dense punctato; scutello triangulari, acuto, punctulato; elytris ovatis, punctato-striatis, intervallis vix convexiusculis, subtiliter dense punctatis, apice magis elevatis; subtus cum pedibus nigro-fuscus, nitidus, prosterno inter coxas lato, utrinque leviter striato, apice fere rotundato, mesosterno punctato, medio anguste lævi, abdomine subtiliter dense strigosulo.

Hab. Sumatra. — Ma collection.

Forme du *spectabilis*, mais plus elliptique, d'une coloration et d'une sculpture très différentes. La coloration rappelle celle de quelques *Ceropria* et *Pseudeumolpus*.

Amarygmus aeneolus, n. sp.

Long. 8 mill. — Breviter ovatus, sat fortiter convexus, valde nitidus, æneus, capite prothoraceque paulo cœrulescentibus et elytris levissime cœruleo micantibus; capite obscuriore, subtilissime punctato, antice profunde trans-

versim sulcato, epistomate labroque ferrugineis; antennis fuscis, gracilibus, medium corporis attingentibus, apicem versus vix crassioribus, articulo 3^o quarto dimidio longiore; prothorace elytris sat angustiore, brevissimo, antice valde angustato, lateribus a basi rotundatis, dorso fere polito, basi leviter bisinuato, angulis posticis sat obtusis; scutello triangulari, lævi; elytris breviter ovatis, basi truncatis, sat fortiter lineato-punctatis, linea suturali striata, secunda postice substriata, intervallis subtiliter densissime punctatis; subtus cum pedibus fusco-metallescens, lævis, pedibus sat gracilibus, tibiis levissime arcuatis.

Hab. Bornéo et Sumatra (S. Müller). — Trois exemplaires du Musée de Leide.

Forme du *convexus*, d'Australie, mais un peu plus convexe et d'une coloration différente ainsi que la sculpture.

Amarygmus variicolor, n. sp.

Long. 5 à 6 mill. — Elliptico-ovatus, sat convexus, cyaneus, nitidus, plus minusve purpureo tinctus; capite subtilissime punctulato, antice fortiter sulcato, oculis valde approximatis; antennis fuscis, medium corporis superantibus, gracilibus, apicem versus paulo crassioribus, articulo 3^o quarto longiore; prothorace minus brevi, elytris parum angustiore, antice valde angustato, lateribus arcuatis, dorso dense subtiliter punctato, basi levissime bisinuato, angulis sat obtusis; scutello ogivali, lævi; elytris ovatis, punctulato-striatis, striis primis paulo profundioribus, intervallis vix convexiusculis, vix distincte punctulatis, striis 2 externis basi et apice obsolescentibus; subtus cum pedibus piceus aut fuscus, fere lævis, abdomine basi vix striolato-punctulato, pedibus gracilibus, tibiis posterioribus levissime arcuatis.

Hab. Bornéo (S. Müller et Schwaner). — Trois exemplaires du Musée de Leide.

Forme des *A. tuberculiger* et *hydrophiloides*, en diffère par la taille bien plus faible, les élytres plus ovalaires, à stries beaucoup moins profondes, à intervalles presque plans.

Amarygmus sanguinans, n. sp.

Long. 8 à 10 mill. — Oblongus, sat fortiter convexus, fuscus, sat nitidus, elytris obscuro-sanguineo plus minusve plagiatis, interdum fere obsolete, capite et prothorace antice interdum sanguineis; capite dense punctato, oculis valde approximatis, antennis fuscis, parum gracilibus, medium corporis attingentibus, articulis 6 ultimis paulo latioribus, articulo 3^o sequenti vix longiore; prothorace transverso, a basi antice angustato, lateribus arcuatis, valde deflexis, dorso dense punctato, basi utrinque vix sinuato; scutello fere ogivali, fere lævi; elytris ovatis, postice attenuatis, punctato-striatis, striis modice impressis, punctis postice obsolete, intervallis planis, indistincte punctulatis; subtus fuscus, vix nitidulus, obsolete punctulatis, femoribus (genubus exceptis) sanguineis.

Hab. Java (Blume), Sumatra (S. Müller) et Bornéo (S. Müller). — Cinq exemplaires du Musée de Leide.

Espèce remarquable par sa coloration et sa forme allongée, convexe; les élytres ont parfois tout le disque rougeâtre, ou bien cette couleur forme 4 taches vaguement indiquées.

Dietysus anthracinus, n. sp.

Long. 12 mill. — *D. ovoideo* similimus, sed paulo minor et angustior, magis nigrans, antennis longioribus, medium elytrorum superantibus, apice haud crassioribus, auriculis antennariis minus elevatis, oculis infra minus expansis, prothorace angusto, vix transverso, angulis anticis sat acute productis, elytris angustioribus, paulo subtilius striatis, striis sat subtiliter sed evidenter punctulatis, intervallis planissimis, subtilissime punctulatis, pedibus nigris, tibiis posticis leviter arcuatis.

Hab. Bornéo. — Ma collection.

Strongylium truncatipenne, n. sp.

Long. 12 mill. — Sat elongatum, convexus, capite prothoraceque æneo-viridulis, vix nitidulis, elytris æneis,

nitidissimis; capite summo valde rugoso, inter oculos breviter sulcatulo, antice dense punctato, lobis antennariis sat elevatis, oculis magnis, antice valde approximatis, antennis parum gracilibus, medium corporis haud attingentibus, fuscis, articulis 4—10 paulo latioribus, compressis, dense punctatis, articulo 3^o quarto longiore, 4^o sat elongato; prothorace transverso, elytris angustiore, lateribus ante angulos et cum angulis antice rotundatis, dorso fortiter punctato-rugoso, basi et antice marginato et polito, angulis posticis rectis; scutello triangulari, polito; elytris parum elongatis, postice paulo ampliatis, apice oblique leviter sinuatis, angulo externo dentiformi, dorso punctato-striatis, extus usque post medium foveolatis, juxta suturam leviter triimpressis, basi extus levissime plicatulis, intervallis lævibus, vix convexiusculis, 3^o basi longe, 5^o 6^o que breviter costulatis, humeris elevatis et paulo incrassatis; subtus virescens, pectore fortiter punctato, abdomine subtilissime striolato-punctato, segmento ultimo apice utrinque impresso et leviter sinuato, pedibus cyaneis, elongatis, gracilibus, punctatis.

Hab. Bornéo occ.: Sambah (Dr. J. Bosscha). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Ressemble beaucoup au *foveolatum* mais la coloration est assez différente, les yeux sont bien plus rapprochés, les antennes moins longues, les élytres sont légèrement impressionnées vers la suture, un peu échancrées à l'extrémité avec une petite dent externe et les pattes sont un peu plus grêles.

Strongylium lanigerum, n. sp.

Long. 16 mill. — Oblongum, postice parum ampliatur, valde convexum, fusco-ænescens, nitidum, sat longe et sat dense griseo-villosum, capite prothoraceque parum nitidis, fere subopacis; capite dense rugosulo-punctato, inter oculos impressiusculo, his sat approximatis, antennis fuscis, basin prothoracis paulo superantibus, basi gracilibus, articulo 3^o elongato, 5 ultimis latis, clavam compressam

efficientibus; prothorace elytris valde angustiore, a basi antice angustato, lateribus fere rectis, antice fere truncato, crasse marginato, angulis obtusissimis, dorso dense punctato-rugoso, basi late sinuato, tenuiter marginato, angulis productis paulo acutis; scutello triangulari-oblongo, acuminato, lævi; elytris ad humeros rotundatis, postice valde declivibus, apice obtusis, seriatim grosse punctatis, postice paulo substriatis, punctis decrescentibus, intervallis parum dense punctatis, prope suturam sat late pluriimpressis; subtus cum pedibus paulo cyanescens et longe villosum, punctulatum, pedibus sat magnis, tibiis medio densius villosis, prosterno lato, plano.

Hab. Bornéo occ.: Sambas (Dr. J. Bosscha). — Deux exemplaires du Musée de Leide.

Ressemble un peu au *S. villosum*, de l'Inde, mais plus grand, plus convexe, d'une coloration différente et remarquable par sa villosité laineuse; le corselet est bien plus long, les élytres sont bien plus fortement ponctuées et sont impressionnées le long de la suture. Les antennes, bien plus courtes, sont comprimées et élargies à l'extrémité.

Strongylium gibbicolle, n. sp.

Long. 17 mill. — Elongatum, subparallelum, crassum sed dorso planiusculum, æneo-cupreolum, nitidum, capite prothoraceque viridi-æneo tinctis, elytris anguste cœruleo marginatis, subtus cum pedibus cyanescens, pectore medio paulo purpurino, femoribus rufis, apice cyaneis; capite summo obscuro, dense punctato, antice nitidiore, viridi-æneo, subtilius punctato, oculis vix separatis, magnis; antennis sat gracilibus, medium corporis fere attingentibus, fuscis, apicem versus leviter crassioribus, articulo 3^o quarto parum longiore; prothorace elytris valde angustiore, vix transverso, dorso bigibboso, medio intus fortiter excavato, fere lævi, undique valde marginato; scutello acute triangulari, medio impresso; elytris elongatis, ad humeros paulo obliquatis, apice obtusis, grosse seriato-punctatis, punctis basi fere foveolatis, apice multo minoribus, inter-

vallis transversim leviter plicatulis, postice subcostatis, lævibus, intervallo suturali medio biimpresso, serie 1^a depressa, minus grosse punctata; subtus fere læve, prosterno inter coxas canaliculato, apice depresso et punctato, pedibus sat elongatis, femoribus apice et tibiis punctulatis.

Hab. Bornéo: Sintang. — Un seul exemplaire du Musée de Leide, présenté par M. W. Albarda.

Voisin des *S. imbrum* et *gratum*, remarquable par la double gibbosité occupant tout le corselet qui est fendu et largement excavé au milieu, les deux saillies paraissant former une tenaille.

Strongylium tenuipes, n. sp.

Long. 13 mill. — Elongatum, convexum, postice attenuatum et leviter compressum, fusco-cœrulescens, capite prothoraceque fere opacis, elytris nitidulis, femoribus posticis basi late rufis; capite dense punctato-rugoso, antice brevi, sutura clypeali profunda, clypeo recte truncato, labro lato, brevi, truncato, oculis magnis, valde convexis, fere contiguus, antennis filiformibus, medium corporis paulo superantibus, articulo 2^o brevissimo, 3^o quarto fere æquali, ultimis 5—11 fere æqualibus; prothorace paulo transverso, elytris valde angustiore, antice angustato, lateribus fere medio angulatis, dorso dense punctato-rugoso, basi et antice marginato, linea dorsali vix impressa; scutello triangulari-ovato, dense punctulato; elytris elongatis, ad humeros obliquatis, apice oblique truncatis et breviter dentatis, dorso seriatim foveolatis, foveolis post medium valde decrescentibus, intervallis convexis, lævibus, usque ad medium transversim leviter plicatulis; pectore lateribus punctato, abdomine subtiliter punctato, pedibus elongatis, gracilibus, femoribus apice paulo crassioribus, tarsis gracillimis.

Hab. Bornéo occ.: Sambas (Dr. J. Bosscha). — Un seul exemplaire du Musée de Leide.

Ressemble beaucoup au *S. japanum* Mars., mais plus bleuâtre, avec les yeux plus gros, plus rapprochés, le front non sillonné et les antennes plus longues, plus grêles

ainsi que les pattes; en outre, les élytres sont tronquées obliquement à l'extrémité, avec l'angle interne formant une petite dent assez pointue.

Oedemeridae.

Ananca impressiuscula, n. sp.

Long. 16 à 21 mill. — Elongata, convexa, canellina, parum nitida, subtiliter pubescens; capite vix perspicue punctulato, mandibulis apice fuscis, oculis valde approximatis, antennis parum gracilibus, elongatis, $\frac{3}{4}$ corporis attingentibus, articulo 1^o elongato, 2^o sat elongato, 3^o sequenti paulo longiore; prothorace elytris valde angustiore, antice leviter ampliato, lateribus fere rectis, ad angulos anticos tantum rotundato, his sat fortiter angulatis, dorso dense sat subtiliter punctato, basi medio sat late impresso, antice et lateribus impressiusculo, margine basali sat acute elevato, ad angulos posticos paulo exserto; scutello dense punctulato, apice obtuso; elytris elongatis, ad humeros sat rotundatis, apice obtusis, sutura et utrinque costulis 3 sat elevatis, intervallis subtiliter dense granulatis; subtus dense subtiliter coriacea; ♂ minor, prothorace basi profundius impresso, elytrorum costulatis parum elevatis, apice obsolete, ♀ major, prothorace basi minus, antice lateribus magis impresso, elytris fortius costulatis.

Hab. Bornéo occ.: Sambas (Dr. J. Bosscha). — Un seul exemplaire du Musée de Leide. — (Pulu Penang: ma collection).

Ressemble à l'*A. sculpticollis* Fairm., de Sumatra, mais d'une coloration roussâtre avec les yeux plus rapprochés, le 2^e article des antennes plus long, le corselet plus étroit, à côtés presque droits, non sinués à la base, le disque moins sillonné, les élytres plus fortement rugueuses, non terminées par une épine.

Paris, 30 Mai 1892.